



麻疹（はしか）について

今年3月に麻疹患者が沖縄で急増し、その後、国内で局所的な流行がみられました。特に、20代・30代を中心に流行がみられています。り患歴・予防接種履歴は確認できていますでしょうか。自分の身を守るため、大切な人を守るために麻疹について正しい理解が必要です。

麻疹とは？

☐感染経路：麻疹患者のせきやくしゃみ、会話で発生するしぶき（飛沫）の中に含まれる麻疹ウイルスを他者が吸い込むことによって感染が成立

☐感染力：1人が発症したら、（麻疹に対する免疫を持っていないと仮定して）12～18人に感染
風疹…5～7 インフルエンザ…1～2 他の疾患に比べても非常に強い感染力！！
予防接種を受けることで感染を予防することができます。

☐症状



藤井良知、西村忠史、中村健：小児感染症学、第1版、南山堂、東京、1985、pp.14より改変

コプリック斑とは？

麻疹特有の症状

口の中の粘膜にできる白いぶつぶつ




コプリック斑
(岡部信彦博士提供)

引用：学校における麻疹対策ガイドライン 第二版 平成30年2月作成


☐定期健康診断時の麻疹のアンケート結果（平成30年度鹿児島大学学部新入生 延1,944人中）

麻疹り患歴



■有 ■無 ■不明

麻疹予防接種歴



■受けた ■受けていない ■不明

麻疹にかかったことがなく、予防接種を受けていない学生は麻疹に感染する確率が高いため予防接種を受けましょう！



☐Q&A コーナー

- Q1 麻疹の予防接種は2回受けないといけない？
予防接種を受けても、免疫がつかない人もいます。また、1回の予防接種で免疫を獲得しても、年月を経る間に免疫が低下するので1回のみでは不十分です。
- Q2 予防接種後、免疫ができるまでどのくらいかかる？
接種後1週間ほどでできはじめます。

新しいスタッフ
を紹介します！

受付
溝 絢香

カウンセラー
入角 千晶
富宿 小百合

【保健管理センター】

☎ : 099-285-7385

✉ : hoken@kuas.kagoshima-u.ac.jp

り患歴、予防接種歴は母子手帳で確認しましょう。

気になる症状がある場合は、まずはお電話でお問い合わせください。